

兽用非处方药

兽药GMP证书编号：(2022)兽药GMP证字11010号
兽药生产许可证号：(2022)兽药生产证字11080号
批准文号：兽药字110802104



氟尼辛葡甲胺颗粒说明书

兽药名称

通用名称：氟尼辛葡甲胺颗粒
商品名称：海炎舒
英文名称：Flunixin Meglumine Granules
汉语拼音：Funixin Pujia'an Keli

主要成分

氟尼辛葡甲胺

性 状

本品为类白色或淡黄色颗粒。

药理作用

药效学 氟尼辛葡甲胺是一种强效环氧化酶抑制剂，具有镇痛、解热、抗炎和抗风湿作用。镇痛作用是通过抑制外周的前列腺素或其感觉增敏物质的合成或它们的共同作用，从而阻断痛觉冲动传导所致。外周组织的抗炎作用可能是通过抑制环氧化酶、减少前列腺素前体物质形成，以及抑制其他介质引起局部炎症反应所致。氟尼辛葡甲胺不影响马的胃肠道蠕动，但可能改善败血性休克动物的血液动力学。

药动学 猪单次肌肉注射给药后(2.2mg/kg体重)，血浆消除半衰期为3~4小时，达峰浓度为2.94 μg/mL，达峰时间为0.4小时，给药18小时后仍可在血液中检测到药物。表观分布容积为2.0L/kg，单次颈部注射的生物利用度为87%。

药物相互作用

- (1) 与其他非甾体类抗炎药同时使用，会加重对胃肠道的毒副作用，如溃疡、出血等。
- (2) 因血浆蛋白结合率高，与其他药物联合应用时，氟尼辛葡甲胺可能置换与血浆蛋白结合的其他药物或者自身被其他药物所置换，以致被置换的药物作用增强，甚至产生毒性。

作用与用途

解热镇痛抗炎药。用于小动物发热性、炎症性疾病、肌肉痛和软组织痛等。

用法与用量

以本品计。内服：一次量，每1kg体重，犬、猫40mg，一日1~2次，连用不超过5日。

不良反应

长期大剂量使用本品可能导致动物胃溃疡及肾功能损伤。

注意事项

消化道溃疡患者慎用。

休 药 期

无需制定。

规 格

按 $C_{14}H_{11}F_3N_2O_2$ 计 5%

包 装

100g/袋

贮 藏

遮光，密闭保存。

生产批号

见打码处

生产日期

见打码处

有 效 期

2年

生产企业

浙江海正动物保健品有限公司
地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号
电话：0571-23208916
传真：0571-23208915
网址：www.hisunah.com

兽用非处方药

兽药GMP证书编号：(2022)兽药GMP证字11010号
兽药生产许可证号：(2022)兽药生产证字11080号
批准文号：兽药字110802104



氟尼辛葡甲胺颗粒说明书

兽药名称

通用名称：氟尼辛葡甲胺颗粒
商品名称：海炎舒
英文名称：Flunixin Meglumine Granules
汉语拼音：Funixin Pujia' an Keli

主要成分

氟尼辛葡甲胺

性 状

本品为类白色或淡黄色颗粒。

药理作用

药效学 氟尼辛葡甲胺是一种强效环氧酶抑制剂，具有镇痛、解热、抗炎和抗风湿作用。镇痛作用是通过抑制外周的前列腺素或其痛觉增敏物质的合成或它们的共同作用，从而阻断痛觉冲动传导所致。外周组织的抗炎作用可能是通过抑制环氧酶、减少前列腺素前体物质形成，以及抑制其他介质引起局部炎症反应所致。氟尼辛葡甲胺不影响马的胃肠道蠕动，但可能改善败血性休克动物的血液动力学。

药动学 猪单次肌肉注射给药后(2.2mg/kg体重)，血浆消除半衰期为3~4小时，达峰浓度为2.94μg/mL，达峰时间为0.4小时，给药18小时后仍可在血液中检测到药物。表观分布容积为2.0L/kg，单次颈部注射的生物利用度为87%。

药物相互作用

- (1) 与其他非甾体类抗炎药同时使用，会加重对胃肠道的毒副作用，如溃疡、出血等。
- (2) 因血浆蛋白结合率高，与其他药物联合应用时，氟尼辛葡甲胺可能置换与血浆蛋白结合的其他药物或者自身被其他药物所置换，以致被置换的药物作用增强，甚至产生毒性。

作用与用途

解热镇痛抗炎药。用于小动物发热性、炎症性疾患、肌肉痛和软组织痛等。

用法与用量

以本品计。内服：一次量，每1kg体重，犬、猫40mg，一日1~2次，连用不超过5日。

不良反应

长期大剂量使用本品可能导致动物胃溃疡及肾功能损伤。

注意事项

消化道溃疡患者慎用。

休 药 期

无需制定。

规 格

按 $C_{14}H_{11}F_3N_3O_2$ 计 5%

包 装

1000g/袋

贮 藏

遮光，密闭保存。

生产批号

见打码处

生产日期

见打码处

有 效 期

2年

生产企业

浙江海正动物保健品有限公司
地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号
电话：0571-23208916
传真：0571-23208915
网址：www.hisunah.com