

阿莫西林克拉维酸钾片说明书

宠物用处方药

【兽药名称】

通用名称：阿莫西林克拉维酸钾片

商品名称：克维舒

英文名称：Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets

汉语拼音：Amoxilin Kelaweisuanjia Pian

【主要成分】阿莫西林和克拉维酸

【性 状】本品为粉红色的圆形刻痕片。

【药理作用】

1. 阿莫西林为 β -内酰胺类抗生素，广谱抗菌，抗菌活性强，主要通过抑制细菌细胞壁黏肽的合成发挥杀菌作用。克拉维酸是 β -内酰胺酶抑制剂，本身只有微弱的抗菌活性，可以与细菌产生的 β -内酰胺酶发生不可逆性结合，可有效提高阿莫西林的杀菌作用。两者合用，可保护阿莫西林免遭 β -内酰胺酶水解。

2. 本品对金黄色葡萄球菌、链球菌、棒状杆菌、梭状芽孢杆菌、炭疽杆菌、牛放线杆菌等革兰氏阳性菌有抗菌活性。对大肠杆菌、沙门氏菌、弯曲杆菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、巴氏杆菌、坏死性梭杆菌、类杆菌属、嗜血杆菌、莫拉菌属、李氏放线杆菌和胸膜肺炎放线杆菌等革兰氏阴性菌也有抗菌活性。

3. 本品对胃酸稳定，口服吸收良好。单胃动物对本品吸收好，血药浓度高，吸收后能广泛分布到各种组织，包括肝、肺、肌肉、胆汁、腹水、胸水和关节液，故对全身性感染的疗效较好。

【适 应 证】本品适用于敏感菌引起的各种感染。用于治疗犬和猫革兰氏阳性和革兰氏阴性敏感细菌的感染，如皮肤及软组织感染（脓性皮炎、脓肿和肛腺炎）、牙感染（牙龈炎）、尿道感染、呼吸道感染和肠炎。

【用法与用量】口服：一次量，犬、猫每1kg体重12.5～25.0mg，一日2次，连用5～7日；一些慢性感染（慢性皮炎、慢性膀胱炎和慢性呼吸道感染）的治疗可连用10～28日。

【不良反应】本品为青霉素类药物，有的动物可能会出现过敏。

【注意事项】1. 本品和氨苄西林有完全交叉耐药性，与青霉素类和头孢菌素类有交叉耐药性。

2. 对青霉素过敏者禁止接触本品。如接触到此产品并出现过敏症状（如皮疹，严重症状有脸部、眼睛或唇肿胀和呼吸困难）时，应该立刻去找医生救助。

3. 与其它青霉素类产品一样，本品不适用于家兔、豚鼠、仓鼠；在用于其它小的草食动物时，应慎用。

4. 若出现过敏反应，可使用肾上腺素或类固醇治疗。

5. 孕畜慎用。

6. 使用后请洗手。

7. 不要让小孩接触到此产品。

【休 药 期】无需制定。

【规 格】50mg（阿莫西林40mg+克拉维酸10mg）

【包 装】（1）10片/板×1板/盒 （2）10片/板×10板/盒

【贮 藏】密封，在凉暗干燥处保存。

【有 效 期】24个月

【批准文号】兽药字110803373

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.hisunah.com

阿莫西林克拉维酸钾片说明书

宠物用处方药

【兽药名称】

通用名称：阿莫西林克拉维酸钾片

商品名称：克维舒

英文名称：Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets

汉语拼音：Amoxilin Kelaweisuanjia Pian

【主要成分】阿莫西林和克拉维酸

【性 状】本品为粉红色的圆形刻痕片。

【药理作用】

1. 阿莫西林为 β -内酰胺类抗生素，广谱抗菌，抗菌活性强，主要通过抑制细菌细胞壁黏肽的合成发挥杀菌作用。克拉维酸是 β -内酰胺酶抑制剂，本身只有微弱的抗菌活性，可以与细菌产生的 β -内酰胺酶发生不可逆性结合，可有效提高阿莫西林的杀菌作用。两者合用，可保护阿莫西林免遭 β -内酰胺酶水解。

2. 本品对金黄色葡萄球菌、链球菌、棒状杆菌、梭状芽孢杆菌、炭疽杆菌、牛放线杆菌等革兰氏阳性菌有抗菌活性。对大肠杆菌、沙门氏菌、弯曲杆菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、巴氏杆菌、坏死性梭杆菌、类杆菌属、嗜血杆菌、莫拉菌属、李氏放线杆菌和胸膜肺炎放线杆菌等革兰氏阴性菌也有抗菌活性。

3. 本品对胃酸稳定，口服吸收良好。单胃动物对本品吸收好，血药浓度高，吸收后能广泛分布到各种组织，包括肝、肺、肌肉、胆汁、腹水、胸水和关节液，故对全身性感染的疗效较好。

【适 应 证】本品适用于敏感菌引起的各种感染。用于治疗犬和猫革兰氏阳性和革兰氏阴性敏感细菌的感染，如皮肤及软组织感染（脓性皮炎、脓肿和肛腺炎）、牙感染（牙龈炎）、尿道感染、呼吸道感染和肠炎。

【用法与用量】口服：一次量，犬、猫每 1kg 体重 12.5～25.0mg，一日 2 次，连用 5～7 日；一些慢性感染（慢性皮炎、慢性膀胱炎和慢性呼吸道感染）的治疗可连用 10～28 日。

【不良反应】本品为青霉素类药物，有的动物可能会出现过敏。

【注意事项】1. 本品和氨苄西林有完全交叉耐药性，与青霉素类和头孢菌素类有交叉耐药性。

2. 对青霉素过敏者禁止接触本品。如接触到此产品并出现过敏症状（如皮疹，严重症状有脸部、眼睛或唇肿胀和呼吸困难）时，应该立刻去找医生救助。

3. 与其它青霉素类产品一样，本品不适用于家兔、豚鼠、仓鼠；在用于其它小的草食动物时，应慎用。

4. 若出现过敏反应，可使用肾上腺素或类固醇治疗。

5. 孕畜慎用。

6. 使用后请洗手。

7. 不要让小孩接触到此产品。

【休 药 期】无需制定。

【规 格】250mg（阿莫西林 200mg+ 克拉维酸 50mg）

【包 装】(1) 10 片 / 板 × 1 板 / 盒 (2) 10 片 / 板 × 10 板 / 盒

【贮 藏】密封，在凉暗干燥处保存。

【有 效 期】24 个月

【批准文号】兽药字 110803374

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.hisunah.com

阿莫西林克拉维酸钾片说明书

宠物用处方药

【兽药名称】

通用名称：阿莫西林克拉维酸钾片

商品名称：克维舒

英文名称：Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets

汉语拼音：Amoxilin Kelaweisuanjia Pian

【主要成分】阿莫西林和克拉维酸

【性 状】本品为粉红色的圆形刻痕片。

【药理作用】

1. 阿莫西林为 β -内酰胺类抗生素，广谱抗菌，抗菌活性强，主要通过抑制细菌细胞壁黏肽的合成发挥杀菌作用。克拉维酸是 β -内酰胺酶抑制剂，本身只有微弱的抗菌活性，可以与细菌产生的 β -内酰胺酶发生不可逆性结合，可有效提高阿莫西林的杀菌作用。两者合用，可保护阿莫西林免遭 β -内酰胺酶水解。

2. 本品对金黄色葡萄球菌、链球菌、棒状杆菌、梭状芽孢杆菌、炭疽杆菌、牛放线杆菌等革兰氏阳性菌有抗菌活性。对大肠杆菌、沙门氏菌、弯曲杆菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、巴氏杆菌、坏死性梭杆菌、类杆菌属、嗜血杆菌、莫拉菌属、李氏放线杆菌和胸膜肺炎放线杆菌等革兰氏阴性菌也有抗菌活性。

3. 本品对胃酸稳定，口服吸收良好。单胃动物对本品吸收好，血药浓度高，吸收后能广泛分布到各种组织，包括肝、肺、肌肉、胆汁、腹水、胸水和关节液，故对全身性感染的疗效较好。

【适 应 证】本品适用于敏感菌引起的各种感染。用于治疗犬和猫革兰氏阳性和革兰氏阴性敏感细菌的感染，如皮肤及软组织感染（脓性皮炎、脓肿和肛腺炎）、牙感染（牙龈炎）、尿道感染、呼吸道感染和肠炎。

【用法与用量】口服：一次量，犬、猫每1kg体重12.5~25.0mg，一日2次，连用5~7日；一些慢性感染（慢性皮炎、慢性膀胱炎和慢性呼吸道感染）的治疗可连用10~28日。

【不良反应】本品为青霉素类药物，有的动物可能会出现过敏。

【注意事项】1. 本品和氨苄西林有完全交叉耐药性，与青霉素类和头孢菌素类有交叉耐药性。

2. 对青霉素过敏者禁止接触本品。如接触到此产品并出现过敏症状（如皮疹，严重症状有脸部、眼睛或唇肿胀和呼吸困难）时，应该立刻去找医生救助。

3. 与其它青霉素类产品一样，本品不适用于家兔、豚鼠、仓鼠；在用于其它小的草食动物时，应慎用。

4. 若出现过敏反应，可使用肾上腺素或类固醇治疗。

5. 孕畜慎用。

6. 使用后请洗手。

7. 不要让小孩接触到此产品。

【休 药 期】无需制定。

【规 格】500mg（阿莫西林400mg+克拉维酸100mg）

【包 装】(1)4片/板×3板/盒 (2)4片/板×15板/盒

【贮 藏】密封，在凉暗干燥处保存。

【有 效 期】24个月

【批准文号】兽药字110803375

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.hisunah.com